GYN-KBH.DK

Vejledning om fjernelse af kondylomer.

Kondylomer er små vortelignede knopper, som skyldes en virus. De kaldes også kønsvorter.
Kondylomer smitter som regel ved samleje, så din partner skal også kontrolleres og evt. behandles.
Smitten kan være sket længe før kondylomerne kan ses.

Hos kvinder sidder de oftest på kønslæberne, ved skede indgangen og mellemkødet, men de kan også sidde i selve skeden eller på livmoderhalsen og rundt om og inden for endetarmsåbningen. Kondylomer bør behandles.
Lægen kan hjælpe dig med at fjerne dem på forskellige måder. De kan ætses væk ved at blive penslet flere gange, de kan fryses væk eller de kan fjernes f.eks. med strøm (el koagulation) eller laser.

Ved Kirurgisk fjernelse af kondylomer brændes eller skæres kondylomer væk med elektricitet, da det er det mest effektive. Dette foretages i lokalbedøvelse.

Der vil være et lille sår, der hvor kondylomerne er fjernet.

- Hvis det er udvendigt på huden skal du bruse området med lunkent vand og duppe tørt. Hvis sårene bliver urene, vasker du også med sæbe og skyller godt. Hvis det svier eller gør ondt, kan du smøre med lokalt bedøvende gel (kan købes i håndkøb.)

- Sidder såret ved urinrøret er det en god ide at komme lokalt bedøvende gel på inden du går på toilettet.

- Sidder såret ved endetarmen, er det en god ide at holde afføringen lind; drik rigeligt vand evt. kombineret med tablet Magnesia 500mg, som er et mildt afføringsmiddel.

HUSK:

Din partner bør også undersøges og evt. behandles samtidig med dig, så i ikke smitter hinanden igen.

Du bør benytte kondom indtil forandringerne er væk og huden er helet ca. 4 uger efter indgrebet.

Du må gerne gå på arbejde og passe din normale hverdag.

Kontroltid efter 6-8 uger

Revideret nov. 2025. Godkendt af LBE

OVERLÆGE/SPECIALLÆGE I GYNÆKOLOGI
Lisbeth Elving
LYGTEN 2 C, 4. SAL TH. * 2400 KØBENHAVN NV.
TIDSBESTILLING DAGLIGT MELLEM KL. 8.00 og 10.00 TEL.: +45 35 84 09 77