



GYN-KBH.DK

Mycoplasma genitalium infektion

Ligesom klamydia kan mycoplasma infektion give svie ved vandladning og øget udflåd, og i sværere tilfælde en infektion i æggeledderne, altså underlivsbetændelse. Hos cirka halvdelen af de inficerede ses ingen symptomer.

Hos kvinder kan følgende symptomer forekomme:

- Udflåd
- Intervalblødninger
- Blødning ved samleje, når penis rammer den irriterede livmoderhals
- Underlivsbetændelse.

Hos mænd kan følgende symptomer forekomme:

- Udflåd, i reglen hvidligt fra urinrøret.
- Svie ved vandladning, ofte beskrevet som "at tisse glasskår"
- Betændelse i bitestiklerne

Forholdsregler og diagnose:

Mycoplasma genitalium infektion findes ved podning fra livmoderhalskanalen hos kvinden og fra urinrøret hos manden. Alternativt kan man stille diagnosen ved en urinprøve, men hos kvinder skal denne ledsages af en podning fra livmoderhalskanalen.

Hvis man får stillet diagnosen og/eller bliver sat i behandling, er det vigtigt, at man opsøger partnere, som man kan have smittet, eller som kan have smittet en, så disse også kan blive undersøgt og behandlet.

Behandling af mycoplasma genitalium infektion:

Behandlingen af en mycoplasma infektion foregår med antibiotika. 4 uger efter behandlingen er afsluttet skal der kontrolpodes, for at tjekke at infektionen er velbehandlet.

Det anbefales at anvende kondom de første 2 uger, efter opstartet behandling.

Husk partnerbehandling.

Revideret august 2019. Godkendt af LBE

OVERLÆGE/SPECIALLÆGE I GYNÆKOLOGI

Lisbeth Elving

LYGTEN 2 C, 4. th. * 2400 KBH. NV.

TIDSBESTILLING DAGLIGT KL. 9:30 - 12:00. TLF. +45 35840977