



GYN-KBH.DK

For mindskning af de små kønslæber

Der foretages en operation mhp at formindske de små kønslæber eller fjerne sygeligt væv. Der skal være en lægelig årsag til, at indgrebet foretages, da det i lovgivningen er besluttet at denne operation ikke må udføres udelukkende af kosmetiske grunde.

De små kønslæber

Kvindens krop og dermed også hendes kønsorgan er udvikles gennem hele livet. Man ser således anderledes ud som 80-årig ift. dengang man var 18 år. Derudover findes der mange forskellige varianter af normal. Man anser som hovedregel først kvinders kønsorganer som fuldt udviklet omkring 25 års alderen. Vi foretager derfor sjældent for mindskning af de små kønslæber før denne alder.

Risici

Det er ikke uden risiko at få foretaget indgrebet. De hyppigste komplikationer er blødning, betændelse og nedsat følsomhed. Der kan komme senfølger i form af arvævs dannelse med skrumpling, så udseendet ikke bliver så pænt.

Det kosmetiske resultat kan således ikke garanteres.

Der kan opstå kroniske smerter og smerter ved samleje

Der findes ingen opgørelser, der viser hvor stor risikoen for de enkelte senfølger er.

Patienttilfredshed efter indgrebet er > 90 %.

Operation

Operationen udføres i lokal analgesi. Den varer ca. ½ time. Der findes flere forskellige operationsmetoder. Hvilken metode der egner sig bedst for dig, vil blive besluttet i forbindelse med forundersøgelsen.

Efter operationen kan såret væske en del og danne en gullig sårskorpe.

Dette er ikke tegn på betændelse. Vævet falder til ro i løbet af en uge, og smerterne fortager sig.

Såret er fuldstændig helet efter ca. 3 uger.

Sygemelding

Sygemelding i 1 uge anbefales.

Ovenstående er læst og forstået.

Dato _____ Underskrift _____

Revideret august 2019. Godkendt af LBE

OVERLÆGE/SPECIALLÆGE I GYNÆKOLOGI

Lisbeth Elving

LYGTEN 2 C, 4. th. * 2400 KBH. NV.

TIDSBESTILLING DAGLIGT KL. 9:30 - 12:00. TLF. +45 35840977