



GYN-KBH.DK

Komplikationer til medicinsk behandling af til grundegået graviditet

Afhængig af scanningsfund, vil 5-20% af de kvinder, der vælger medicinsk behandling for til grundegået graviditet, have behov for yderligere behandling, i form af ekstra medicin eller en udskrabning. Dette enten på grund af, at den først givne medicin ikke virker tilstrækkeligt eller på grund af blødningskomplikationer.

Færre end 1% får underlivsbetændelse.

I forbindelse med aborten skal du være opmærksom på evt. tegn på infektion, feber, mere kraftige og tiltagende smerter, evt. gult pus som udflåd med dårlig markant lugt. I disse tilfælde skal du straks henvende dig i klinikken eller kontakte akutvagten 1813.

Du må ikke styrtbløde – dvs. hvis din blødning er meget voldsom og ikke stilner af, skal du kontakte os eller akutvagten **1813**

Hygiejne: Undgå at bruge tampon den første måned efter din abort. Hyppige skift af hygiejnebind for at holde området tørt og rent. Brug gerne bruser ved toiletbesøg. Du skal undgå at gå i karbad og svømmehal de første 3-4 uger. Ligeledes bør du anvende kondom ved samleje de første 4 uger.

Du er altid velkommen til at ringe til os på tlf.: 35840977

Revideret nov. 2025. Godkendt af LBE

OVERLÆGE/SPECIALLÆGE I GYNÆKOLOGI

Lisbeth Elving

LYGTEN 2 C, 4. SAL TH. * 2400 KØBENHAVN NV.

TIDSBESTILLING DAGLIGT MELLEM KL. 8.00 og 10.00 TEL.: +45 35 84 09 77