



Kikkertundersøgelse af blæren

Hvis du har tilbagevendende blærebetændelser eller blod i urinen på trods af behandling for urinvejsinfektion, kan en kikkertundersøgelse af blæren være nødvendig.

Hvordan foregår undersøgelsen?

Undersøgelsen varer ca. 10 min. Du skal dog afsætte 30 min., da du også skal tale med lægen. Ved undersøgelsen ligger du på samme måde, som når du er til en gynækologisk undersøgelse. Der bliver lagt noget lokalbedøvende gel i urinrøret. Lægen fører herefter en tynd kikkert, ind igennem urinrøret og fylder blæren op med saltvand.

Gør kikkertundersøgelsen ondt?

Nej, normalt ikke, men de fleste synes, det er lidt ubehageligt at få ført kikkerten op i blæren.

Mulige gener efter undersøgelsen

De første gange du lader vandet efter undersøgelsen, kan der være lidt blod i urinen, og der kan være lidt svie ved vandladning.

Ca. en procent af patienterne får blærebetændelse efter en kikkertundersøgelse. Vi anbefaler, at du drikker ca. to liter væske den dag, du har fået lavet undersøgelsen for at mindske risikoen for blærebetændelse.

OVERLÆGE/SPECIALLÆGE I KVINDESYGDOMME & FØDSELHJÆLP

Lisbeth Elving

LYGTEN 2 C, 4. SAL TH. * 2400 KØBENHAVN NV
TIDSBESTILLING DAGLIGT MELLEM KL. 10 OG 14:30