GYN-KBH.DK

Frysebehandling af livmoderhalsen

Hvad er formålet med frysebehandlingen:
At mindske udflåd, pletblødninger, blødning ved samleje og (HPV) infektion.

Behandling:
Ved frysebehandling af livmoderhalsen foretages en overfladisk frysning, i ca. 45 sek. hvorved de yderste celler afstødes og nye celler genopbygges efter et par uger.
Behandlingen foretages normalt 2 gange med 6 ugers interval.
Ved første frysning vil der typisk være lidt menstruationslignende smerter, men derudover er behandlingen smertefri.
Enkelte vil have brug for Panodil som smertestillende.
Du kan gå hjem umiddelbart efter behandlingen

Efter behandlingen:
Efter frysningen vil der ofte være vandtyndt evt. lidt blodigt udflåd. Lugten kan være sødlig, men er ikke udtryk for en infektion. Udflåds generne kan persistere i op til 4-6 uger.

Revideret nov. 2025 Godkendt af LBE

OVERLÆGE/SPECIALLÆGE I GYNÆKOLOGI
Lisbeth Elving
LYGTEN 2 C, 4. SAL TH. * 2400 KØBENHAVN NV.
TIDSBESTILLING DAGLIGT MELLEM KL. 8.00 og 10.00 TEL.: +45 35 84 09 77