GYN-KBH.DK

Undersøgelse af æggelederne – HSU

Undersøgelse af æggelederne, er en lille og hurtig undersøgelse, som varer ca. 15-20 min.

En time før undersøgelsen skal du tage smertestillende medicin i form af 1000 mg paracetamol sammen med 400 mg ibuprofen.

Undersøgelsen udføres ved, at man ved scanning undersøger, om der er passage gennem æggelederne under gennemskylning med sterilt saltvand.
Man undersøger samtidigt, om der er forandringer inde i livmoderhulen, som kan være årsag til barnløsheden.
Undersøgelsen vil som regel kun medføre let ubehag i form af menstruations lignende smerter. Efter undersøgelsen kan du bløde lidt et par dage. Du behøver ikke at være fastende.
Det er vigtigt, at du oplyser om allergi og dit medicinforbrug inden indgrebet.
Undersøgelsen erstatter en røntgenundersøgelse med kontrast. Hvis det er vanskeligt at tolke resultatet, videresendes du til en yderligere undersøgelse på en røntgenafdeling.

På din 1. menstruationsdag ringer du til klinikken og bestiller tid til undersøgelsen, som normalt foretages mellem 6. og 11. cyklusdag. Du må ikke bløde på undersøgelsesdagen.

Efter undersøgelsen
Du bør undgå hav bad, svømmehal og badekar samt anvende kondom de første 2 uger pga. risiko for infektion.
Kontakt klinikken eller din egen læge, hvis du får feber eller stærke smerter.

Du er altid velkommen til at ringe og stille spørgsmål: 35840977

Revideret nov. 2025 Godkendt af LBE

OVERLÆGE/SPECIALLÆGE I GYNÆKOLOGI
Lisbeth Elving
LYGTEN 2 C, 4. SAL TH. * 2400 KØBENHAVN NV.
TIDSBESTILLING DAGLIGT MELLEM KL. 8.00 og 10.00 TEL.: +45 35 84 09 77