



GYN-KBH.DK

Kikkertundersøgelse af livmoderhulen

Du skal til kikkertundersøgelse af livmoderhulen. Denne undersøgelse foretages, hvis man har set en polyp, muskelknode og ved blødnings eller graviditet/fertilitets problemer.

Her kan du læse mere om undersøgelsen og hvad du skal være opmærksom på.

Undersøgelsen foregår ved, at lægen fører et lille kikkertinstrument gennem skeden op i livmoderhulen, efter at der er anlagt lokalbedøvelse. For at få et godt billede gennem kikkerten bliver livmoderhulen skyllet med saltvand. I kikkerten kan man få et billede af livmoderhulens slimhinde. Hvis der findes en polyp, en muskelknode eller eventuelt en skivevæg i livmoderen, kan denne evt. fjernes gennem kikkerten. I nogle tilfælde vil dette dog kræve, at der aftales en ny tid for indgrebet. Undersøgelsen tager ca. 30 minutter.

Før du kommer til undersøgelsen:

Hvis undersøgelsen skal foretages, fordi du har svært ved at blive gravid, er det vigtigt, at du ikke har menstruation. Hvis du har menstruation omkring undersøgelsesdagen, skal du ringe til os hurtigst muligt og aftale en anden tid.

Du bør tage paracetamol 1000 mg og ibuprofen 400 mg 1 time inden undersøgelsen. Livmoderen trækker sig nemlig enkelte gange sammen som ved menstruation, når der skal opereres inde i livmoderhulen.

Hvis undersøgelsen skal foretages, fordi du har blødningsproblemer, kan den gennemføres, selv om du bløder - blot det ikke er for kraftigt. Undersøgelsen kan ikke laves, hvis du er gravid. Derfor er det vigtigt, at du bruger prævention, hvis du skal undersøges senere end 10 dage efter første menstruationsdag.

Efter undersøgelsen

Du kan have let blødning og lette mavesmerter efter undersøgelsen. For dette kan du tage smertestillende

Medicin i form af 1000 mg paracetamol og 400 mg ibuprofen hver 6.-8. time det første døgn.

Når du er kommet hjem

Du kan forvente let blødning i nogle dage efter undersøgelsen afhængigt af, hvad der er foretaget. Kontakt klinikken eller din egen læge, hvis du får feber, stærke smerter eller meget kraftig blødning.

Du bør undgå hav bad, svømmehal og badekar samt anvende kondom de første 1-2 uger pga. risiko for infektion.

Svar på undersøgelsen

Efter ca. 2-3 uger får du svar fra klinikken på undersøgelsen af det væv der er fjernet.

Revideret Jan 2026 Godkendt af LBE

OVERLÆGE/SPECIALLÆGE I GYNÆKOLOGI

Lisbeth Elving

LYGTEN 2 C, 4. SAL TH. * 2400 KØBENHAVN NV.

TIDSBESTILLING DAGLIGT MELLEM KL. 8.00 og 10.00 TEL.: +45 35 84 09 77